Luniak M. 1980. Birds of allotment gardens in Warsaw. Acta Ornithol. 17: 297–319.
Luniak M. 1981. The birds of the park habitats in Warsaw. Acta Ornithol. 18: 335–374.
Luniak M. 1982. Ptaki rezerwatu Las Bielański w Warszawie. Ochr. Przyr. 44: 219–243.
Luniak M., Kalbarczyk W., Pawłowski W. 1964. Ptaki Warszawy. Acta Ornithol. 8: 175–285.
Luniak M., Jabłoński P., Marczak P. 1986. Ptaki parku Łazienki Królewskie (Warszawa) w latach 1954–1984. Acta Ornithol. 22: 23–50.
Luniak M., Kozłowski P., Nowicki W., Plit J. 2001. Ptaki Warszawy 1962–2000. IGiPZ PAN, Warszawa.
Mazgajski T.D., Rejt Ł., Chromy M., Podlacha F. 2001. Stan i zmiany awifauny rezerwatu „Las Bielański" w Warszawie. Parki Nar. Rez. Przyr. 20: 27–41.
Nowicki W. 2001. Ptaki śródmieścia Warszawy. MiIZ PAN, Warszawa.
Pawłowski W. 1964. Awifauna parku Skaryszewskiego w Warszawie. Prz. Zool. 7: 273–284.
Pielowski Z. 1957. Ptaki w parku Łazienkowskim w Warszawie. Chrońmy Przyr. 13: 34–41.
Rowiński P., Nowakowski J.K., Kowalski M. 1998. Zespół ptaków lęgowych „Rezerwatu im. Króla Jana Sobieskiego" w Warszawie. Kulon 3: 75–87.
Ruprecht A.L., Szwagrzak A. 1988. Atlas rozmieszczenia sów *Strigiformes* w Polsce. Studia Naturae (Seria A) 32: 1–153.
Sikora A., Rodhe Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.). 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985–2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
Węgrzynowicz A. 2006. Changes in numbers of the house sparrow (*Passer domesticus*) and tree sparrow (*Passer montanus*) in Warsaw, Poland, during 1971–2006. International Studies on Sparrows 31: 13–26.
Wojtatowicz J. (red.) 2005. Warszawska Przyroda – Obszary i Obiekty Chronione. Biuro Ochrony Środowiska Urzędu M. St. Warszawy, Warszawa.

Jakub Gryz
Zakład Ekologii Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
j.gryz@ibles.waw.pl

Dagny Krauze-Gryz
Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa, Wydział Leśny, SGGW
Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
Dagny.Krauze@wl.sggw.waw.pl

Drugie stwierdzenie mewy różowej *Rhodostethia rosea* w Polsce

W dniu 14.04.2012 podczas liczenia ptaków zimujących na Zatoce Gdańskiej zaobserwowaliśmy dorosłą mewę różową *Rhodostethia rosea*. Ptak był obserwowany na plaży, na wybrzeżu Zatoki Gdańskiej na Wyspie Sobieszewskiej (Gdańsk, woj. pomorskie) podczas żerowania pośród wyrzuconych przez morze resztek roślinnych. Był on mało płochliwy i dał się podejść na niewielką odległość (fot. 1). Mewa różowa przebywała w tym miejscu do 18.04.2012 przemieszczając się wzdłuż plaży morskiej Wyspy Sobieszewskiej.

Ptak wielkością był zbliżony do mewy małej *Hydrocoleus minutus*, lecz jego ubarwienie było odmienne. Dziób był czarny i krótki. Ubarwienie niewielkiej i krągłej głowy było śnieżno białe z czarnym okiem i ciemnym przyciemnieniem przy oku. Na karku zaznaczały się nieliczne ciemne piórka będące zaczątkiem wykształcania się czarnej obroży występującej w szacie godowej. Wierzch ciała był popielaty, pierś zaś lekko różowa, ale nie tak intensywnie jak w szacie godowej. Lotki były nieco bardziej szare niż grzbiet z wyraźnym zaczernie-

Fot. 1. Mewa różowa *Rhodostethia rosea,* Wyspa Sobieszewska, kwiecień 2012 (fot. P. Nagórski) – *Ross's Gull, Sobieszewo, April 2012*

niem na końcu skrajnej lotki pierwszego rzędu. Ogon był biały i klinowato zakończony. Nogi intensywnie czerwone.

Obserwacja została zaakceptowana przez Komisję Faunistyczną. Stwierdzenie to jest drugim w Polsce i pierwszym na krajowym wybrzeżu Bałtyku. Po raz pierwszy mewę różową stwierdzono 15.01.1994 w miejscowości Nieszawa k. Włocławka, gdzie również zaobserwowano osobnika dorosłego (Zieliński & Piotrowski 1998).

Mewa różowa gniazduje przede wszystkim w arktycznej części Syberii od półwyspu Tajmyr do rzeki Kołyma, gdzie jej populacja jest szacowana na 25 000–100 000 osobników (Wetlands International 2006 za www.birdlife.org/datazone). Gniazduje także lokalnie na Grenlandii oraz nieregularnie w Kanadzie. Jest to gatunek wędrowny i po okresie lęgowym przemieszcza się na północ na Ocean Arktyczny (del Hoyo et al. 1996, Snow & Perrins 1998). Zimuje na południe od lęgowisk na Półwyspie Kamczackim, wzdłuż północnych wybrzeży Alaski lub południowo-wschodnich wybrzeży Grenlandii (del Hoyo et al. 1996). Na lęgowiska przylatuje pod koniec maja, a lęgi rozpoczyna od początku czerwca w luźnych koloniach liczących 2–10 par (rzadko do 18 par), często z innymi gatunkami, np. rybitwą popielatą *Sterna paradisaea* (del Hoyo et al. 1996, Snow & Perrins 1998). Lęgowiska opuszcza pod koniec lipca, przemieszczając się podczas migracji w małych stadach liczących 2–16 osobników (del Hoyo et al. 1996).

Mewę różową odnotowano w wielu krajach europejskich, choć wszędzie jest ptakiem rzadkim. W basenie Morza Bałtyckiego najczęściej, bo aż 23 razy, stwierdzono ją w Szwecji, ale tylko dwa stwierdzenia pochodzą z wybrzeża Bałtyku, a pozostałe dotyczą terenów

śródlądowych. Poza tym odnotowano 10 stwierdzeń w Danii, 8 w Finlandii, 4 w Estonii i jedno na Łotwie (www.netfugl.dk, www.tarsiger.com). W Niemczech stwierdzono ją 8 razy (Deutsche Seltenheitenkommission 2008), w Holandii 16 razy (Ovaa et al. 2012), a we Francji 7 razy (Ruber et al. 2008). Najczęściej jest spotykana w Wielkiej Brytanii, gdzie do roku 2010 odnotowano 92 stwierdzenia (Hudson & the Rarities Committee 2011). W Europie najdalej na południe mewę różową stwierdzono we Włoszech (Meissner et al. 1997). Wiosną 2012 odnotowano również dwie inne obserwacje mewy różowej w basenie Bałtyku, w Szwecji i Finlandii (www.tarsiger.com).

Dziękujemy Tadeuszowi Stawarczykowi, Włodzimierzowi Meissnerowi oraz Zbigniewowi Kajzerowi za pomoc przy opracowaniu notatki. Praca Grupy Badawczej Ptaków Wodnych KULING nr 150.

Summary: Second record of the Ross's Gull *Rhodostethia rosea* in Poland. On 14.04.2012, an adult Ross's Gull was observed and photographed in Sobieszewo, on the coast of the Bay of Gdańsk, Baltic Sea. The bird was observed the last time in 18 April. It was the second record in Poland. The description of the bird is given and occurrence in Europe is discussed. The record was accepted by the Avifaunistic Commission.

Literatura

Deutsche Seltenheitenkommission 2008. Seltene Vogelarten in Deutschland von 2001 bis 2005. Limicola 22: 249–339.

del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J. 1996. Handbook of the Birds of the World. 3. Hoatzin to Auks. Lynx Edicions, Barcelona.

Hudson N. and the Rarities Committee 2011. Report on rare birds in Great Britain in 2010. Brit. Birds 104: 557–629.

Meissner W., Ściborski M., Scebba S., di Lauro F., Moschetti G. 1997. Second record of Ross's Gull (*Rhodostethia rosea*) for Italy. Gli Uccelli d'Italia 22: 16–17.

Ovaa A., Groenendijk D., Berlijn M. and CDNA. 2012. Rare birds in the Netherlands in 2011. Dutch Birding 34: 349–377.

Ruber S., Fremont J.-Y., Flitti A. & le CHN. 2008. Les oiseaux rares en France en 2006 et 2007. Ornithos 15: 313–355.

Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Oxford University Press.

Zieliński P., Piotrowski M. 1998. Pierwsze stwierdzenie mewy różowej *Rhodostethia rosea* w Polsce. Not. Orn. 39: 261–262.

Piotr Nagórski
Sulnówko 90, 86-100 Świecie

Magdalena Hadwiczak
Wyszyńskiego 6/22, 11-200 Bartoszyce

Stwierdzenie strepeta *Tetrax tetrax* na Lubelszczyźnie

Dnia 8.09.2012 w godzinach popołudniowych, obserwując ptaki w okolicach miejscowości Machnówek (pow. tomaszowski, woj. lubelskie), zaobserwowałem dwa strepety *Tetrax tetrax* w upierzeniu samic/ptaków młodych. Ptaki zostały zauważone na ściernisku porzepakowym. Strepety ukrywały się w zagłębieniach pola i zostały wykryte przypadkowo dopiero po zbliżeniu się obserwatora na odległość ok. 10 m. Siedzące na polu ptaki początkowo