śródlądowych. Poza tym odnotowano 10 stwierdzeń w Danii, 8 w Finlandii, 4 w Estonii i jedno na Łotwie (www.netfugl.dk, www.tarsiger.com). W Niemczech stwierdzono ją 8 razy (Deutsche Seltenheitenkommission 2008), w Holandii 16 razy (Ovaa et al. 2012), a we Francji 7 razy (Ruber et al. 2008). Najczęściej jest spotykana w Wielkiej Brytanii, gdzie do roku 2010 odnotowano 92 stwierdzenia (Hudson & the Rarities Committee 2011). W Europie najdalej na południe mewę różową stwierdzono we Włoszech (Meissner et al. 1997). Wiosną 2012 odnotowano również dwie inne obserwacje mewy różowej w basenie Bałtyku, w Szwecji i Finlandii (www.tarsiger.com).

Dziękujemy Tadeuszowi Stawarczykowi, Włodzimierzowi Meissnerowi oraz Zbigniewowi Kajzerowi za pomoc przy opracowaniu notatki. Praca Grupy Badawczej Ptaków Wodnych KULING nr 150.

Summary: Second record of the Ross's Gull *Rhodostethia rosea* in Poland. On 14.04.2012, an adult Ross's Gull was observed and photographed in Sobieszewo, on the coast of the Bay of Gdańsk, Baltic Sea. The bird was observed the last time in 18 April. It was the second record in Poland. The description of the bird is given and occurrence in Europe is discussed. The record was accepted by the Avifaunistic Commission.

Literatura

Deutsche Seltenheitenkommission 2008. Seltene Vogelarten in Deutschland von 2001 bis 2005. Limicola 22: 249–339.

del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J. 1996. Handbook of the Birds of the World. 3. Hoatzin to Auks. Lynx Edicions, Barcelona.

Hudson N. and the Rarities Committee 2011. Report on rare birds in Great Britain in 2010. Brit. Birds 104: 557–629.

Meissner W., Ściborski M., Scebba S., di Lauro F., Moschetti G. 1997. Second record of Ross's Gull (*Rhodostethia rosea*) for Italy. Gli Uccelli d'Italia 22: 16–17.

Ovaa A., Groenendijk D., Berlijn M. and CDNA. 2012. Rare birds in the Netherlands in 2011. Dutch Birding 34: 349–377.

Ruber S., Fremont J.-Y., Flitti A. & le CHN. 2008. Les oiseaux rares en France en 2006 et 2007. Ornithos 15: 313–355.

Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Oxford University Press.

Zieliński P., Piotrowski M. 1998. Pierwsze stwierdzenie mewy różowej *Rhodostethia rosea* w Polsce. Not. Orn. 39: 261–262.

Piotr Nagórski
Sulnówko 90, 86-100 Świecie

Magdalena Hadwiczak
Wyszyńskiego 6/22, 11-200 Bartoszyce

Stwierdzenie strepeta *Tetrax tetrax* na Lubelszczyźnie

Dnia 8.09.2012 w godzinach popołudniowych, obserwując ptaki w okolicach miejscowości Machnówek (pow. tomaszowski, woj. lubelskie), zaobserwowałem dwa strepety *Tetrax tetrax* w upierzeniu samic/ptaków młodych. Ptaki zostały zauważone na ściernisku porzepakowym. Strepety ukrywały się w zagłębieniach pola i zostały wykryte przypadkowo dopiero po zbliżeniu się obserwatora na odległość ok. 10 m. Siedzące na polu ptaki początkowo

Fot. 1. Strepet *Tetrax tetrax*, Machnówek, wrzesień 2012 (fot. P. Stachyra) – *Little Bustard, Machnówek, September 2012*

zdradzały swoją obecność jedynie poprzez wyciągnięte w górę szyje. Już wtedy można było zauważyć dziób charakterystyczny dla ptaków z rodziny dropi *Otididae* oraz płową, ciemno kreskowaną szyję. Zaskoczone spotkaniem ptaki ostrożnie podniosły się z ziemi prezentując pełne upierzenie – płowobrązowe, czarno plamkowane pióra wierzchu ciała oraz białawy brzuch. Po trwającej około 10 minut obserwacji, prowadzonej w bardzo dobrych warunkach atmosferycznych, w czasie której wykonano kilka zdjęć, ptaki odleciały na sąsiednie pole. Strepetów dalej nie szukałem i nie płoszyłem, sądząc że będzie można odnaleźć je następnego dnia. W dniu 9.09.2012 były one obserwowane wraz z grupą wcześniej powiadomionych obserwatorów – udało się wówczas sfotografować je w locie. Poszukiwania ptaków na polach w okolicy w następnym dniu nie przyniosły rezultatów.

Obserwacja uzyskała akceptację Komisji Faunistycznej. Jest to pierwsze stwierdzenie strepeta w Polsce od 1950 roku, kiedy to zabito jednego ptaka k. Łęczycy w Łódzkiem (Tomiałojć & Stawarczyk 2003). Jesienią 2012 roku strepety obserwowano w Europie także w kilku innych miejscach poza obszarem regularnego występowania, co sugeruje wystąpienie niewielkiego nalotu. Chronologicznie były to obserwacje: 8.09.2012 – Bulahovka Liman, Dnepropetrovsk, Ukraina; 10.09.2012 – Pyhtää, Finlandia; 29.09–21.10.2012 – Wedeler Marsch, Kreis Pinneberg, Niemcy oraz 20.10.2012 – Balatonszárszó, Węgry (Deutsche Avifaunistische Kommission, in litt.).

Strepet jest rzadkim gatunkiem lęgowym w Europie i Azji. Lęgowiska tego gatunku w Palearktyce obejmują Półwysep Iberyjski, Włochy, Francję i Maroko (populacja zachodnia) oraz południową Ukrainę, Gruzję, południową Rosję po Kazachstan, Kirgistan, południowo-zachodnie Chiny i północny Iran, gdzie gniazduje populacja wschodnia (Snow & Perrins 1998, Birdlife International 2013). Globalna populacja jest szacowana na około 240 000 osobników (Birdlife International 2013), a największa populacja lęgowa licząca 71 000–

147 000 osobników występuje w Hiszpanii (Garcia de la Morena et al. 2006). Obecnie liczebność gatunku na wielu obszarach zmniejsza się drastycznie na skutek intensyfikacji rolnictwa, przez co brakuje dogodnych miejsc lęgowych w postaci łąk i ugorów porośniętych roślinnością stepową zapewniającą ukrycie i dogodne miejsce do lęgów (de Juana 2009). Część ptaków migruje na zimowiska. Populacja wschodnia zimuje w Turcji i na Kaukazie, głównie w Azerbejdżanie oraz w Iranie. Niewielka populacja odbywająca lęgi na Ukrainie oraz zapewne część populacji z Rosji zimuje w rejonie Morza Czarnego. Populacja zachodnia zimuje głównie w rejonie Morza Śródziemnego, w Hiszpanii i Portugalii. [http://www.iucnredlist.org/details/106002759/0]

Summary: Record of the Little Bustard *Tetrax tetrax* in the Lublin province. On 8–9.09.2012 , two Little Bustards were observed and photographed on arable fields at Machnówek, Lublin province. It constitutes the first record of this species in Poland since 1950.

Literatura

BirdLife International 2013. Species factsheet: *Tetrax tetrax*. Downloaded from http://www.birdlife.org on 24/05/2013.

Garcia de la Morena E.L., Bota G., Ponjoan A., Morales M.B. 2006. El sisn comn en Espaa: i censo nacional (2005). SEO/BirdLife, Madrid.

de Juana E. 2009. The dramatic decline of the Little Bustard *Tetrax tetrax* in Extramadura (Spain). Ardeola 56: 119–125.

Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Editions. Oxford University Press.

Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro-Natura", Wrocław.

Marcin Przepiórka
Leszetyckiego 11/5, 20-863 Lublin